



Presselin Thyri Badiaga Mischung

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Homöopathisches Arzneimittel

Zur Anwendung bei Kindern über 12 Jahren und bei Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Presselin Thyri Badiaga jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Presselin Thyri Badiaga und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Presselin Thyri Badiaga beachten?
3. Wie ist Presselin Thyri Badiaga einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Presselin Thyri Badiaga aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST PRESSELIN THYRI BADIAGA UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Presselin Thyri Badiaga ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PRESSELIN THYRI BADIAGA BEACHTEN?

Wann dürfen Sie Presselin Thyri Badiaga nicht anwenden?

Presselin Thyri Badiaga darf nicht angewendet werden

- bei Kindern unter 6 Jahren,
- bei Iodüberempfindlichkeit
- bei einer Unterfunktion der Schilddrüse, die z. B. durch rasche Erschöpfbarkeit, Antriebschwäche, Frieren, depressive Verstimmungszustände und/oder eine Gewichtszunahme gekennzeichnet sein kann
- bei Schilddrüsenvergrößerungen (Drüsenschwellung im Halsbereich) ohne Funktionsstörungen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Schilddrüsenerkrankungen sollte dieses Arzneimittel nicht ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält 53 Vol.-% Alkohol.

Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern ab 6 Jahren bis unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Presselin Thyri Badiaga mit anderen Arzneimitteln

Eine gleichzeitige Gabe von Schilddrüsenhormonpräparaten sollte vermieden werden, da hierzu keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Arzneimitteln, die die Schilddrüsenfunktion hemmen, ist deren Dosis vom Arzt zu überprüfen und ggf. herabzusetzen. Hinweis: Eine Anwendung von Lycopus-haltigen Arzneimitteln stört die Durchführung einer Schilddrüsendiagnostik mit Radio-Isotopen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Presselin Thyri Badiaga zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Presselin Thyri Badiaga hat keinen oder nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Presselin Thyri Badiaga

Dieses Arzneimittel enthält 53 Vol.-% Alkohol.

3. WIE IST PRESSELIN THYRI BADIAGA EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen in etwas Wasser einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen in etwas Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Presselin Thyri Badiaga eingenommen haben, als Sie sollten:

Vergiftungs- oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Presselin Thyri Badiaga vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Nehmen Sie die folgende Dosis zum nächsten Zeitpunkt ein, an dem Sie diese normalerweise einnehmen würden. Fahren Sie mit der Dosierung so fort, wie verordnet oder in dieser Packungsbeilage beschrieben.

Wenn Sie die Einnahme von Presselin Thyri Badiaga abbrechen:

Sollten bei Ihnen Nebenwirkungen auftreten, sprechen Sie bitte mit Ihrem homöopathisch erfahrenen Therapeuten über die weitere Behandlung.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Presslin Thyri Badiaga Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Bei längerer und/oder höher dosierter Einnahme von Presselin Thyri Badiaga kann es in seltenen Fällen (mehr als einer von 10.000 Behandelten) zu einer Vergrößerung der Schilddrüse (Drüsenschwellung im Halsbereich) kommen. In diesen Fällen sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

Plötzliches Absetzen von Lycopus-Zubereitungen kann zu einer Verstärkung des Beschwerdekompleses führen.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST PRESSELIN THYRI BADIAGA AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Presselin Thyri Badiaga enthält:

Zusammensetzung:

10 g (10 g entsprechen ca. 10,9 ml) enthalten als arzneilich wirksame Bestandteile:

Arsenum iodatum Dil. D6	2 g
Spongilla lacustris Ø	1 g
Lycopus virginicus Ø	2 g
Euspongia officinalis Ø	1 g

Sonstige Bestandteile:

Ethanol 30 % (m/m) (4 g)

1 g entspricht 30 Tropfen

Wie Presselin Thyri Badiaga aussieht und Inhalt der Packung:

Presselin Thyri Badiaga ist in Flaschen mit 50 ml erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Combustin Pharmazeutische Präparate GmbH, Offinger Str.7

88525 Hailtingen

Telefon: 0 73 71 – 96 53 56

www.presselin.de

info@combustin.de

Hersteller

Spreewälder Arzneimittel GmbH, Schulstraße 9,

15913 Märkische Heide

www.spreewaelder-arzneimittel.de

info@spreewaelder-arzneimittel.de

gute Besserung!